

**Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Shranite ga. Morda boste navodilo želeli ponovno prebrati.**

Zdravilo je na voljo brez recepta. Namenjeno je za lajšanje blažjih prehladnih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo. Če se znaki vaše bolezn ne izboljšajo v sedmih dneh, morate obiskati zdravnika.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.

Vsebina navodila

1. Kaj so kapljice Echinaforce in čemu jih uporabljamo?
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli kapljice Echinaforce?
3. Kako jemati kapljice Echinaforce?
4. Možni neželeni učinki.
5. Shranjevanje in rok uporabnosti.

Echinaforce peroralne kapljice, raztopina

Echinacea purpurea (L.), herba et radix, extractum fluidum

Zdravilne učinkovine so

Etanolno vodni izvleček zeli in korenin škrlatne ehinaceje (Echinacea purpurea / L. /, herba et radix, extractum fluidum).

Pomožne snovi

Prečiščena voda, etanol.

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet

Farmedica, d. o. o., Leskoškova 12, Ljubljana

Ime in naslov izdelovalca

Bioforce AG, CH-9325 Roggwil, Švica

1. Kaj so kapljice ECHINAFORCE in čemu jih uporabljamo?

Kapljice Echinaforce so zdravilo rastlinskega izvora, pripravljene iz sveže, cvetoče zeli in korenin škrlatne ehinaceje.

Zdravilo povečuje imunsko odpornost telesa. Uporabljajte ga za preprečevanje prehlada in pospeševanje zdravljenja znakov prehlada kot so: kašelj, nahod, solzenje, vnetje žrela, glavobol in mišične bolečine.

1 ml raztopine vsebuje:

- tekoči etanolno vodni izvleček zeli škrlatne ehinaceje (razmerje droga: ekstrakcijsko topilo je 1 : 12; ekstrakcijsko topilo je 57,3 % m/m etanol) 860 mg

in

- tekoči etanolno vodni izvleček korenin škrlatne ehinaceje (razmerje droga : ekstrakcijsko topilo je 1 : 11; ekstrakcijsko topilo je 57,3 % m/m etanol)..... 45 mg

Latinsko ime za škrlatno ehinacejo je *Echinacea purpurea*, v slovenščini jo imenujemo tudi *škrlatni ameriški slamnik*.

Pakiranje

Škatlica s stekleničko po 50 ml raztopine.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli kapljice Echinaforce?

Kdaj kapljic Echinaforce ne smete jemati?

V skladu s strokovnimi podatki iz literature jih ne smete uporabljati pri progresivnih sistemskih boleznih, na primer tuberkulozi, levkemiji, kolagenozi, multipli sklerozi, aidsu, infekciji s HIV in drugih avtoimunskih boleznih.

Kapljic Echinaforce ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi na rastline iz družine košaric (kot so arnika, rman, škrlatna ehinaceja, ozkolistna ehinaceja, bleda ehinaceja itd.) ali na njihove izvlečke oziroma na posamezne pomožne snovi v zdravilu.

Svojega zdravnika ali farmacevta seznanite s svojimi preobčutljivostmi za našete sestavine, če so vam znane. Omenite tudi morebitna druga zdravila, ki jih uporabljate za lajšanje prehladnih težav.

Posvetujte se z zdravnikom tudi, če ste gornje navedbe imeli kadarkoli v preteklosti.

Uporaba med nosečnostjo in dojenjem

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden boste vzeli katerokoli zdravilo.

O škodljivosti kapljic Echinaforce med nosečnostjo in dojenjem ni podatkov. V skladu s splošno medicinsko prakso odsvetujemo uporabo nosečnicam in doječim materam, če se pred tem niso posvetovale z zdravnikom. Kapljice Echinaforce vsebujejo 65 % (V/V) etanola (alkohola), zato pogledajte opozorila v poglavju: *Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce*.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji, če se držite predpisanega odmerjanja.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce

Kapljice Echinaforce vsebujejo 65 % (V/V) etanola (alkohola). Z vsakim odmerkom boste zaužili do 0,5 g etanola, ki škoduje osebam z jetrno boleznijo, epilepsijo, poškodbami ali boleznimi možganov ali če so alkoholiki, prav tako nosečnicam in majhnim otrokom. Lahko spremeni ali stopnjuje učinek drugih zdravil.

Če bi se pojavil resen neželeni učinek zdravila, se o tem nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo Echinaforce je na voljo tudi brez alkohola, v obliki tablet.

Na kaj morate biti pozorni, kadar jemljete druga zdravila

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili ni znano. Kapljice Echinaforce vsebujejo 65 % (V/V) etanola (alkohola), zato zaradi medsebojnega delovanja z zaužitim etanolom preberite opozorila v poglavju: *Pomembne informacije o nekaterih sestavinah kapljic Echinaforce.*

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

3. Kako jemati kapljice Echinaforce?

Če vam zdravnik ni predpisal drugače, se ravnajte po naslednjih navodilih:

- odrasli in mladostniki nad 14 let: 3- do 5-krat dnevno 20 do 25 kapljic (0,6 do 0,8 ml).
- otroci, starejši od 6 let: trikrat dnevno po 10 kapljic (0,3 ml), po posvetu z zdravnikom.
Z enim odmerkom otrok zaužije do 0,175 g etanola, zato ga je potrebno nujno razredčiti.

Raztopino nakapajte v pol kozarca vode in popijte.

Kapljic Echinaforce ne jemljite neprekinjeno več kot dva meseca.

Če menite, da je učinek kapljic Echinaforce premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje

Kaj storiti, če ste vzeli večji odmerek kapljic Echinaforce, kot bi smeli?

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom. Literatura ne poroča o toksičnih učinkih po zaužitju večjega odmerka.

Kaj storiti, če ste pozabili vzeti kapljice Echinaforce?

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega. Nadaljujte zdravljenje po predpisani shemi.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila imajo lahko tudi kapljice Echinaforce neželene učinke. V redkih primerih se lahko ob jemanju kapljic Echinaforce pojavi preobčutljivostna reakcija, na koži. Če jo opazite, takoj prenehajte jemati kapljice in o tem nemudoma obvestite zdravnika. Če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Shranjevanje

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte v tesno zaprti originalni ovojnini pri temperaturi od +15 do +25 °C, na suhem mestu.

Zdravila ne uporabljajte, če je bil varnostni mehanizem zaporke pred prvim odpiranjem odlomljen.

Rok uporabnosti

Kapljic Echinaforce ne smete jemati po izteku roka uporabnosti, ki je odtisnjen na ovojnini. Tinkture iz svežih rastlin se včasih lahko skalijo, vendar to ne vpliva na njihov učinek.

Po prvem odpiranju stekleničke je rok uporabnosti zdravila 4 mesece.

Način izdajanja

Izdajanje zdravila: brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Datum zadnje revizije navodil

7. februar 2002